

| Antikonvulsivum<br>(Abkürzung)            | Tagesdosis<br>Kind                                          | Tagesdosis<br>Erwachsene | Zeitraum<br>bis zum<br>konstanten<br>Blutspiegel | Therapeutische<br>Serumkonzentration<br>der Gesamtfraction<br>Umrechnungsfaktor() | Enzyminduktion<br>Interaktionen                     | Störwirkungen                                   | Zulassung                                              | Besonderheiten                                                                                            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brivaracetam</b> <sup>2</sup><br>(BRV) | 2 – 4<br>mg/kg,<br>Höchstosis<br>(off-Label)<br>ca. 5 mg/kg | 50 – 200 mg              | 2 Tage                                           | 0,2 – 2 mg/l =<br>1 – 10 µmol/l (5)                                               | Leichte Enzyminduktion: Anstieg<br>von CBZ- Epoxid. | Müdigkeit, Schwindel,<br>Übelkeit, Gereiztheit. | Zusatztherapie<br>fokale<br>Epilepsien,<br>ab 4 Jahre. | Wirksame<br>Dosis vom<br>ersten Tag an,<br>einfacher Austausch mit LEV,<br>parenterale<br>Form vorhanden. |