

| Antikonvulsivum<br>(Abkürzung) | Tagesdosis<br>Kind | Tagesdosis<br>Erwachsene | Zeitraum<br>bis zum<br>konstanten<br>Blutspiegel | Therapeutische<br>Serumkonzentration<br>der Gesamtfraction<br>Umrechnungsfaktor() | Enzyminduktion<br>Interaktionen                        | Störwirkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zulassung                                                                              | Besonder-<br>heiten |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ethosuximid</b><br>(ESM)    | 20–30<br>mg/kg     | 750–1500<br>mg           | 4–10 Tage                                        | 40–100 mg/l =<br>280–700 µmol/l                                                   | Keine wesentlichen,<br>VPA-Spiegel können<br>abfallen. | <b>Häufiger:</b> Gastrointestinale<br>Symptome (Übelkeit, Appetit-<br>losigkeit, Gewichtsabnahme,<br>Singultus), Kopfschmerzen,<br>Sedierung, Schlafstörungen,<br>psychotische Symptome.<br><b>Seltener:</b> Depression,<br>Dyskinesien, Akathisie, Exan-<br>them, Erythema multiforme,<br>Stevens-Johnson-Syndrom,<br>Lupus erythematodes,<br>hämatotoxische Effekte. | Generalisierte<br>Epilepsien<br>mit Absencen<br>und/oder<br>myoklonischen<br>Anfällen. |                     |