

Antikonvulsivum (Abkürzung)	Tagesdosis Kind	Tagesdosis Erwachsene	Zeitraum bis zum konstanten Blutspiegel	Therapeutische Serumkonzentration der Gesamtfraction Umrechnungsfaktor()	Enzyminduktion Interaktionen	Störwirkungen	Zulassung	Besonder- heiten
Felbamat (FBM)	20–45 mg/kg	1200–3600 mg	4 Tage	20–45 mg/l = 85–190 µmol/l (4,2)	Anstieg der Blut- spiegel von CBZ-Epoxid, PHT und VPA, Abfall der Serumkonzent- ration von CBZ, die Serumkonzent- ration von FBM sinkt ab unter Einfluss von CBZ, PHT und PB und steigt unter Einfluss von VPA an.	Appetitlosigkeit, Gewichtsver- lust, Dysgeusie, Dyspepsie, Kopfschmerzen, Schwindel, Diplopie, Sedierung, Schlaf- losigkeit, aplastische Anämien (1:4000), toxische (auch fatale) Hepatopathie, Exantheme, Stevens-Johnson-Syndrom.	Zusatztherapie als Ultima Ratio bei Lennox- Gastaut- Syndrom, ab 4 Jahre.	Blutbildkon- trollen vor Therapie- beginn und danach alle 2 Wochen.