

Antikonvulsivum (Abkürzung)	Tagesdosis Kind	Tagesdosis Erwachsene	Zeitraum bis zum konstanten Blutspiegel	Therapeutische Serumkonzentration der Gesamtfraction Umrechnungsfaktor()	Enzyminduktion Interaktionen	Störwirkungen	Zulassung	Besonder- heiten
Levetiracetam (LEV)	20–60 mg/kg	1000–4000 mg	2 Tage	5–41 mg/l = 30–240 µmol/l (6), therapeutischer Bereich wegen Dosisunabhängigkeit hinsichtlich Wirk- samkeit und Verträ- glichkeit fraglich.	Keine wesentlichen.	Sedierung, Reizbarkeit, Depression, Stimmungs- schwankungen, psychotische Episoden, Schwächegefühl, Schleimhautirritationen der oberen Atemwege. Selten: Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Dyspepsie, Durchfall, Gewichtsabnahme (sehr selten).	Monotherapie fokale Epilep- sien ab 16 Jahre, Zusatz- therapie fokale Epilepsien ab 1 Monat, Zusatz- therapie GTKA bei juveniler myoklonischer Epilepsie ab 12 Jahre.	Auch parente- ral verfügbar.